Slovakia adame global

ADAMA Global SK sk. Slovak; Katalóg prípravkov na ochranu rastlín. Filter . Filtrovat podla: Na profesionálne pouzitie a na súkromné domáce pozemky. Krajiny. Kategória. Adjuvanty, regulátory rastu a biostimulanty (10) Fungicíd (22) Herbicíd (19) Insekticíd (6)

Prípravok aplikujte od fázy zaciatku predlzovacieho rastu az po plné klasenie obilnín (BBCH 30 - 55), v závislosti od výskytu a intenzity chorôb, v dávke 0,75 l/ha sólo alebo 0,4 l/ha v TM s azolovými prípravkami, s ktorými vykazuje synergický efekt ...

Adame Global, Skopje. 7 likes · 1 talking about this. Delivering top-notch solar power plant (SPP) projects from start to finish. We excel in design, engineering, financing, EPC, operation, and ...

Amisulbrom je unikátna úcinná látka, ktorá sa zabudováva do voskovej vrstvy kde vytvára zásobáren úcinnej látky zasahuje peronospóru vo viacerých stádiách vývoja (uvolnovanie spór, klícenie a pohyblivost zoospór, rast mycélia).

Vo vinici osetrujte na základe signalizácie od rastovej fázy vyvinutého stvrtého listu (BBCH 14) do rastovej fázy zaciatok dozrievania (BBCH 81).Aplikacnú dávku a objem vody odporúcame prispôsobit rastovej fáze ...

Adjuvant GROUNDED sa pouzíva s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade so schválenými podmienakmi pre ich pouzitie. Pouzíva sa v nasledujúcich plodinách do uvedeného vývojového stádia plodiny so vsetkými schválenými prípravkami na ochranu rastlín do ich plnej autorizovanej dávky.

A VSETKO HRÁ! Prípravok aplikujte pri objavení prvých príznakov napadnutia, prípadne na základe signalizácie v priebehu vegetácie od fázy zaciatku zapájania plodiny: 10% rastlín v riadku zapojených az do zaciatku zltnutia listov (starnutie) (BBCH 31-91).

Fytotoxicita: Ak je prípravok MIRADOR UNI aplikovaný v súlade s platnou etiketou je tolerantný k osetrovaným rastlinám. Upozornenie: Prípravok MIRADOR UNI môze spôsobit poskodenie jadrovín, preto zabránte úletu postrekovej kvapaliny! Niektoré odrody jabloní sú velmi citlivé na prípravok MIRADOR

UNI. Postrekovac, ktorý bol pouzitý na aplikáciu ...

Proti piliarke repkovej a skockám osetrujte od vzchádzania do konca októbra.Prvé osetrenie proti blyskácikovi vykonajte na zaciatku predlzovacieho rastu, kedy základ kvetenstva je krytý zelenými lístkami a rastliny sú asi 20 cm vysoké, pricom sú súcasne nicené aj krytonosy. Dalej osetrujeme v období objavovania sa prvých púcikov na okrajoch kvetenstva ...

Dávka vody: 200 - 500 l/ha. Maximálny pocet aplikácií za vegetacné obdobie: 2x. Interval medzi aplikáciami: 21 dní. Termín aplikácie. Prípravok SPYRALE aplikujte proti hubovým chorobám repy cukrovej a repy krmnej preventívne, resp. pri zaznamenaní prvých príznakov napadnutia, od rastovej fázy zaciatku zapájania porastov: od 10 % rastlín v riadku ...

Osetrenia fungicídom Slape Trio je mozné realizovat v rámci sirokého aplikacného intervalu.Vzhladom na spektrum úcinnosti a fyziologické pôsobenie prípravku je vsak optimálne Slape Trio pouzit najmä na ochranu posledného resp. predposledného listu.Napriek tomu, ze tento prípravok vykazuje výbornú kuratívnu a eradikatívnu úcinnost, túto jeho ...

MAVRIK je kontaktný insekticíd vo forme vodnej emulzie typu olej - voda urcený na nicenie cicavých a zravých skodcov v chmeli, polných plodinách, zelenine, zemiakoch, vinici a v ovocných kultúrach s minoritnou regictráciou v repe cukrovej, sóji, jahodách, jadrovinách a ...

Neosetrujte plodiny poskodené skodcami, chorobami, alebo stresované nedostatkom zivín. Prípravok taktiez neaplikujte na vlhký porast pri teplotách nizsích ako 12 °C, resp. vyssích ako 25 °C, dalej na výrazne zaburinených plochách, ak neboli pouzité prípravky proti burinám, pretoze skrátenie stebiel môze vytvorit dobré podmienky pre rozvoj burín.

Find company research, competitor information, contact details & financial data for ADAME, s. r. o. of Lozorno, Bratislavský kraj. Get the latest business insights from Dun & Bradstreet.

Pestovanie hlavných polnohospodárskych plodín ako sú obilniny, cukrová repa, kukurica, hrach atd. ako následných plodín v normálnom osevnom slede po repke ozimnej osetrenej prípravkom Sultan Top je mozné bez obmedzenia.. V prípade potreby predcasnej zaorávky repky, môze byt bez obmedzenia znovu osiata repka ozimná. Ozimné obilniny môzu ...

ADAMA Global SK sk. Slovak; Moderné otroctvo. Nase pravidlá týkajúce sa

otroctva a obchodovania s ludmi. ADAMA sa zaviazala chránit ludské práva. Na túto hodnotu kladieme velký dôraz a povazujeme ju za základný kamen nasich aktivít. Okrem toho investujeme velké úsilie do identifikácie a obchodovania s partnermi, ktorí ...

Adjuvant vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou pre pouzitie v polnohospodárstve, záhradníctve a v lesníctve. Je urcený pre zlepsenie vlastností postrekových kvapalín, znízenie úletu pri aplikácii, rovnomernému pokrytiu osetrovaného povrchu a zlepsenie biologickej úcinnosti pesticídov, predovsetkým kontaktných fungicídov a prípravkov na báze ...

Aj ked je GOLTIX GOLD vysoko selektívny cukrovej repe, pri TM s kombinovanými prípravkami dodrzujte zásady platné pre ich aplikáciu. GOLTIX GOLD je selektívny, nebola zaznamenaná odrodová citlivost, avsak pri TM kombinácii s inými herbicídmi môze za negatívnych klimatických podmienok (ako napr. mráz, extrémne výkyvy teplôt) dôjst ...

Adaptic je zmácadlo vyvinuté pre zvýsenie herbicídnej úcinnosti glyfosátu a kontaktných fenoxykyselín. Zlepsuje vlastnosti postrekovej kvapaliny znízením pH, redukciou tvrdosti vody a obmedzením penivosti.

Proti piliarke repkovej a skockám osetrujte od vzchádzania do konca októbra.Prvé osetrenie proti blyskácikovi vykonajte na zaciatku predlzovacieho rastu, kedy základ kvetenstva je krytý zelenými lístkami a ...

Status je prípravok, ktorým rastlinu zároven stimulujeme k vyssiemu výkonu fotosyntézy a tým vyssiemu ukladaniu asimilátov a zároven na lepsie vyuzitie dusíka. Tento synergický efekt sa vzdy prejaví, a to aj v ...

PENDIGAN aplikujte do 2 dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd.PENDIGAN môzete tiez aplikovat POST-emergentne po vzídení ozimných obilnín (BBCH 13), kedy sa metlicka obycajná nachádza maximálne v rastovej fáze 1 - 2 listov (BBCH 11-12).. Pri predpokladanom výskyte psiarky rolnej, lipkavca obycajného a parumanceka nevonavého ...

PENDIGAN aplikujte do 2 dní po sejbe na dobre pripravenú pôdu bez hrúd.PENDIGAN môzete tiez aplikovat POST-emergentne po vzídení ozimných obilnín (BBCH 13), kedy sa metlicka obycajná nachádza maximálne ...

MIRADOR sa pouzíva pred alebo na zaciatku výskytu choroby. V obilninách je mozné prípravok aplikovat 1 x za sezónu. 1. Skorsí termín aplikácie: Skoré osetrenie porastov obilnín sa odporúca vykonat na zaciatku výskytu choroby a za predpokladu skorého nástupu silného infekcného tlaku.Psenicu osetrujte vo fáze plne vyvinutého vlajkového listu az do fázy ...

Adjuvant vo forme emulgovatelného koncentrátu urcený na zlepsenie vlastností postrekových kvapalín, zvýsenie a zrýchlenie penetrácie prípravkov do rastlín a zvýsenie biologickej úcinnosti pesticídov, predovsetkým systémových fungicídov.

Príslubom znacky ADAMA je Listen. Learn. Deliver. Nás inovovaný príslub zákazníkom znamená v slovencine - Nacúvat. Ucit sa. Dodávat.

Contact us for free full report

Web: https://www.containerserviceforu1.co.za/contact-us/
Email: energystorage2000@gmail.com
WhatsApp: 8613816583346